

## CENOVNIK FARMACEUTSKIH PROIZVODA

R. br.	Naziv proizvoda, farmaceutski oblik, sastav	Pakovanje	V.P.C. (din.)	Uslovi čuvanja
<b>FARMACEUTSKI PROIZVODI</b>				
<b>TEČNE FORME</b>				
1.	<b>NEOSTREP</b> , suspenzija za injekciju Benzilpenicilin-prokain 200.000 i.j. /ml, Dihidrostreptomycin 200 mg/ml,	100 ml	720,00	2 - 8 °C
2.	<b>NEOSTREP L.A.</b> , suspenzija za injekciju Benzilpenicilin-prokain 120.000 i.j./ml, Benzilpenicilin-benzatin 80.000 i.j./ml, Dihidrostreptomycin-sulfat 200 mg/ml	100 ml	760,00	2 - 8 °C
3.	<b>STREPTOMYCIN 20 %</b> , rastvor za injekciju Streptomycin-sulfat 200 mg/ml	100 ml	470,00	2 - 8 °C
4.	<b>NEOPEN</b> , suspenzija za injekciju Benzilpenicilin-prokain 300.000 i.j./ml	100 ml	550,00	2 - 8 °C
5.	<b>NEOPEN L.A.</b> , suspenzija za injekciju Benzilpenicilin-prokain 150.000 i.j./ml, Benzilpenicilin-benzatin 150.000 i.j./ml	100 ml	600,00	2 - 8 °C
6.	<b>NEOCYCLIN L.A.</b> , rastvor za injekciju Oksitetraciklin (u obliku dihidrata) 200 mg/ml	100 ml	440,00	do 25 °C
7.	<b>NEOGENT</b> , rastvor za injekciju Gentamicin-sulfat 80 mg/ml	100 ml	460,00	do 25 °C
8.	<b>NEOLI-SPEC</b> , rastvor za injekciju Linkomicin 50mg/ml; spektinomycin 100 mg/ml	100 ml	750,00	do 25 °C
9.	<b>NEOSULF</b> , rastvor za injekciju Sulfadimidin-natrijum 200 mg/mL, Trimetoprim 40 mg/mL	100 ml	470,00	do 25 °C
10.	<b>NEOTYL 200</b> , rastvor za injekciju Tilozin-tartarat 200 mg/ml	100 ml	520,00	do 25 °C
11.	<b>NEOFLOXACIN-S 10 %</b> , rastvor za injekciju Enrofloksacin 100 mg/ml	100 ml	420,00	do 25 °C
12.	<b>NEOFLOXACIN 10 %</b> , oralni rastvor Enrofloksacin 100 mg/ml	500 ml	880,00	do 25 °C
13.	<b>NEOFLOXACIN 10 %</b> , oralni rastvor Enrofloksacin 100 mg/ml	20 ml	120,00	do 25 °C
14.	<b>NEOFENICOL INJ</b> , rastvor za injekciju Florfenikol 300 mg/ml	100 ml	990,00	do 25 °C
15.	<b>NEOFENICOL 10 %</b> , oralni rastvor Florfenikol 100 mg/ml	1000 ml	4.000,00	do 25 °C
16.	<b>OXYTOCIN INJ</b> , rastvor za injekciju Oksitocin 10 i.j. / ml	50 ml	270,00	2 - 8 °C
17.	<b>OXYTOCIN INJ</b> , rastvor za injekciju Oksitocin 10 i.j. / ml	20 ml	170,00	2 - 8 °C
18.	<b>NEOMETHASON</b> , rastvor za injekciju Deksametazon-natrijum-fosfat 2,64 mg/ml	100 ml	490,00	do 25 °C
19.	<b>NEOMETHASON</b> , rastvor za injekciju Deksametazon-natrijum-fosfat 2,64 mg/ml	50 ml	330,00	do 25 °C
20.	<b>NEONALGIN</b> , rastvor za injekciju Metamizol-natrijum 500 mg/ml	250 ml	1.200,00	do 25 °C
21.	<b>NEONALGIN</b> , rastvor za injekciju Metamizol-natrijum 500 mg/ml	100 ml	470,00	do 25 °C
22.	<b>NEOSITOL</b> , rastvor za injekciju Levamisol-hidrohlorid 75 mg/ml	100 ml	390,00	do 25 °C

23.	<b>NEOSITOL</b> , rastvor za injekciju Levamisol-hidrohlorid 75 mg/ml	50 ml	270,00	do 25 °C
24.	<b>NEOSITOL</b> , rastvor za injekciju Levamisol-hidrohlorid 75 mg/ml	20 ml	200,00	do 25 °C
25.	<b>NEOMECTIN</b> , rastvor za injekciju Ivermektin 10 mg/ml	100 ml	420,00	do 25 °C
26.	<b>NEOMECTIN</b> , rastvor za injekciju Ivermektin 10 mg/ml	50 ml	330,00	do 25 °C
27.	<b>NEOMECTIN</b> , rastvor za injekciju Ivermektin 10 mg/ml	20 ml	220,00	do 25 °C
28.	<b>NEOCAL 300</b> , rastvor za injekciju Kalcijum-glukonat 160 mg/ml, kalcijum-glicerofosfat 66 mg/ml, magnezijum-hlorid,heksahidrat 64 mg/ml, kofein 20 mg/ml	250 ml	555,00	do 25 °C
29.	<b>NEOCAL 300</b> , rastvor za injekciju Kalcijum-glukonat 160 mg/ml, kalcijum-glicerofosfat 66 mg/ml, magnezijum-hlorid,heksahidrat 64 mg/ml, kofein 20 mg/ml	100 ml	333,00	do 25 °C
30.	<b>NEOVIT C</b> , rastvor za injekciju Askorbinska kiselina 100 mg/ml	100 ml	470,00	do 25 °C
31.	<b>NEO-PENICILLIN</b> , prašak za suspenziju za injekciju Benzilpenicilin-prokain 3.000.000 i.j., Benzilpenicilin-kalijum 1.000.000 i.j.	50 x 4 MIU	7.500,00	do 25 °C
32.	<b>NEOCEFTIOFUR HCL 5 %</b> , rastvor za injekciju Ceftiofur hidrohlorid 50 mg/ml	250 ml	2.000,00	2 - 8 °C
33.	<b>NEOCEFTIOFUR HCL 5 %</b> , rastvor za injekciju, Ceftiofur hidrohlorid 50 mg/ml	100 ml	900,00	2 - 8 °C
34.	<b>NEOMULIN 20 %</b> , rastvor za injekciju Tiamulin-hidrogenfumarat 200 mg/ml	100 ml	850,00	do 25 °C
35.	<b>NEOFOS</b> , rastvor za injekciju Butafosfan 100mg/ml, Cijanokobalamin 50 mcg/ml	100 ml	770,00	2 - 8 °C
36.	<b>NEOPROST</b> , rastvor za injekciju Kloprostenol 0.250mg/ml	20 ml	800,00	do 25 °C
37.	<b>NEORELIN</b> , rastvor za injekciju Buserelin 0.004mg/ml	20 ml	700,00	2 - 8 °C
38.	<b>NEOBUTON</b> , rastvor za injekciju Menbuton 100mg/ml	100 ml	880,00	do 25 °C
39.	<b>NEOTULATHROMYCIN</b> , rastvor za injekciju Tulatromicin 100mg/ml	100 ml	8.000,00	do 25 °C
40.	<b>NEOTULATHROMYCIN</b> , rastvor za injekciju Tulatromicin 100mg/ml	50 ml	5.000,00	do 25 °C
41.	<b>NEOFLUNIXIN</b> , rastvor za injekciju Fluniksini 50mg/ml	100 ml	800,00	do 30 °C
42.	<b>NEOPROFEN</b> , rastvor za injekciju Ketoprofen 100mg/ml <b>U PROCESU REGISTRACIJE</b>	100 ml	880,00	do 30 °C
43.	<b>NEOMARBOFLOXACIN</b> , rastvor za injekciju Marbofloksacin 100mg/ml <b>U PROCESU REGISTRACIJE</b>	100 ml	2.400,00	do 25 °C
44.	<b>NEOCLOSANTEL</b> , rastvor za injekciju Klosantel 50mg/ml <b>U PROCESU REGISTRACIJE</b>	100 ml	700,00	do 25 °C

PRAŠKASTE FORME				
45.	<b>NEOCOCCYN WSP</b> , oralni prašak Amprolijum hidrohlorid 200 mg/g Sulfakvinoksalin natrijum 200 mg/g	1 kg	4.000,00	do 25 °C
46.	<b>NEOCOCCYN WSP</b> , oralni prašak Amprolijum hidrohlorid 200 mg/g Sulfakvinoksalin natrijum 200 mg/g	10 g	100,00	do 25 °C
47.	<b>NEOSITOL 10 %</b> , oralni prašak Levamisol-hidrohlorid 100 mg/g	500 g	800,00	do 25 °C
48.	<b>NEOSITOL 10 %</b> , oralni prašak Levamisol-hidrohlorid 100 mg/g	15 g	60,00	do 25 °C
49.	<b>NEOMECTIN P 0,2%</b> , oralni prašak Ivermektin 2mg/g	5 kg	3.200,00	do 25 °C
50.	<b>NEOMECTIN P 0,2%</b> , oralni prašak Ivermektin 2mg/g	500 g	300,00	do 25 °C
51.	<b>NEOBENDAZOLE P</b> , oralni prašak Albendazole 100mg/g	500 g	600,00	do 25 °C
52.	<b>STREPTOMYCIN P</b> , oralni prašak Streptomycin-sulfat 1 g/g	500 g	3.500,00	do 25 °C
53.	<b>STREPTOMYCIN P</b> , oralni prašak Streptomycin-sulfat 1 g/g	100 g	700,00	do 25 °C
54.	<b>STREPTOMYCIN P</b> , oralni prašak Streptomycin-sulfat 1 g/g	5 g	70,00	do 25 °C
55.	<b>NEOSULF P</b> , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Trimetoprim 20 mg/g	500 g	420,00	do 25 °C
56.	<b>NEOSULF P</b> , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Trimetoprim 20 mg/g	100 g	150,00	do 25 °C
57.	<b>NEOSULF P</b> , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Trimetoprim 20 mg/g	20 g	80,00	do 25 °C
58.	<b>NEOSULFOX P</b> , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Neomicin-sulfat 60 mg/g Oksitetraciklin hidrohlorid 40 mg/g	5 kg	5.500,00	do 25 °C
59.	<b>NEOSULFOX P</b> , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Neomicin-sulfat 60 mg/g, Oksitetraciklin hidrohlorid 40 mg/g	500 g	520,00	do 25 °C
60.	<b>NEOSULFOX P</b> , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Neomicin-sulfat 60 mg/g, Oksitetraciklin hidrohlorid 40 mg/g	100 g	150,00	do 25 °C
61.	<b>NEOSULFOX P</b> , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Neomicin-sulfat 60 mg/g Oksitetraciklin hidrohlorid 40 mg/g	20 g	70,00	do 25 °C
62.	<b>NEOLISPEC P-66</b> , oralni prašak Linkomicin 22 mg/g Spektinomycin 44 mg/g	500 g	1200,00	do 25 °C
63.	<b>NEOLISPEC P-66</b> , oralni prašak Linkomicin 22 mg/g Spektinomycin 44 mg/g	100 g	330,00	do 25 °C
64.	<b>NEOLISPEC P-66</b> , oralni prašak Linkomicin 22 mg/g Spektinomycin 44 mg/g	20 g	120,00	do 25 °C

65.	<b>NEOPHENICOL P</b> , oralni prašak Florfenikol 20 mg/g	5 kg	5.200,00	do 25 °C
66.	<b>NEOPHENICOL P</b> , oralni prašak Florfenikol 20 mg/g	500 g	490,00	do 25 °C
67.	<b>DOKSILAN-C 20</b> , oralni prašak Doksiciklin hiklat 200 mg/g, Askorbinska kiselina 40 mg/g	500 g	2.500,00	do 25 °C
68.	<b>DOKSILAN-C 20</b> , oralni prašak Doksiciklin hiklat 200 mg/g, Askorbinska kiselina 40 mg/g	100 g	600,00	do 25 °C
69.	<b>DOKSILAN-C 20</b> , oralni prašak Doksiciklin hiklat 200 mg/g, Askorbinska kiselina 40 mg/g	20 g	150,00	do 25 °C
70.	<b>NEOMULIN DHC-P</b> , oralni prašak Tiamulin-hidrogenfumarat 33,3 mg/g, Doksiciklin-hiklat 100mg/g	500 g	1.800,00	do 25 °C
71.	<b>NEOMULIN DHC-P</b> , oralni prašak Tiamulin-hidrogenfumarat 33,3 mg/g, Doksiciklin-hiklat 100mg/g	100 g	500,00	do 25 °C
72.	<b>NEOFLOXACIN-P 10 %</b> , oralni prašak Enrofloksacin 100 mg/g	500 g	800,00	do 25 °C
73.	<b>NEOCOLISTIN P</b> , oralni prašak Kolistin sulfat 4.800.000 i.j./g	500 g	880,00	do 25 °C
74.	<b>NEOCOLISTIN P</b> , oralni prašak Kolistin sulfat 4.800.000 i.j./g	100 g	400,00	do 25 °C
75.	<b>NEOAMPICILLIN P 20%</b> , oralni prašak Ampicilin- trihidrat 200 mg/g	500 g	1.330,00	do 25 °C
76.	<b>NEOAMPICILLIN P 20%</b> , oralni prašak Ampicilin- trihidrat 200 mg/g	100 g	400,00	do 25 °C
77.	<b>NEOAMOXICILLIN P 20%</b> , oralni prašak Amoxicilin- trihidrat 200 mg/g	500 g	1.350,00	do 25 °C
78.	<b>NEOAMOXICILLIN P 20%</b> , oralni prašak Amoxicilin- trihidrat 200 mg/g	100 g	400,00	do 25 °C

**DETALJNA UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA SE NALAZE NA NAŠEM SAJTU: <http://fmpharm.co.rs/>**  
**NAPOMENA: Svi proizvodi podležu posebnoj stopi PDV od 10%, na osnovu Zakona o PDV ( « Sl. glasnik RS » broj 108/2013).**

**DATUM PRIMENE: 01.11.2022.**

**Direktor  
Srđan Marković**

